



ukrainian agribusiness club

Зведена таблиця контрольованих дослідів по залишкам хлорпірифосу - EFSA

Культура	Реґіон	Формуляція	Залишки хлорпірифосу в контрольованих дослідів (мг/кг)	Рекомендації/коментарі	Пропозиція рівня максимальних залишків, мг/кг	Максимальні залишки в дослідів, мг/кг	Середнє значення залишків в дослідів, мг/кг
Пшениця	ЄС(Пн)	Інші (ніж Пірінекс)	< 0.01; < 0.01; < 0.01; 0.02; 0.04; 0.05; 0.05; 0.07	Досліди з подвійним внесенням замість одного. Перше внесення мало незначний вплив.	ОД 5	0,07	0,03
	ЄС(Пд)	Інші	4x < 0.01	Досліди відповідно стандартів GAP	0,01	0,01	0,01
Кукурудза	ЄС(Пн)	Інші	8 x < 0.01	Досліди з завищеними нормами - 720 г д.р. на га в фазі ВВСН 65-85 замість 400 г д.р.	0,01	0,01	0,01
	ЄС (Пд)	Інші	7 x < 0.01		0,01	0,01	0,01
Сояшник	ЄС (Пд)	Інші	4 x < 0.01	Досліди відповідно стандартів GAP	0,01	0,01	0,01
Ріпак	ЄС(Пн)	Інші	7 x < 0.01	Досліди відповідно стандартів GAP. А	0,01	0,01	0,01
Цукрові буряки	ЄС(Пн)	Інші	8 x < 0.01	Досліди відповідно стандартів GAP. А	0,01	0,01	0,01